

陕西省药品监督管理局

陕西省医疗机构制剂标准

SXYLZJ-2026022

黄芪当归精口服液

Huangqi Dangguijing Koufuye

【处方】 黄芪

当归

【制法】 以上两味，当归用蒸馏法提取，收集蒸馏液备用；药渣与黄芪加水煎煮二次，每次 1.5 小时，加水量依次为 8 倍量、6 倍量，合并煎液，滤过，滤液浓缩至相对密度约为 1.20（50℃）的清膏，加入乙醇搅拌，使含醇量达到 75%，静置沉淀至少 48 小时，滤过，滤液浓缩至无醇味，备用。取蜂蜜 50g，蔗糖 200g 加水溶解，滤过，加入上述两种备用液中，加水至 1000ml，调 pH 为 4.5～6.5，搅拌均匀，过滤，灌封，灭菌（流通蒸汽 100℃，50 分钟），即得。

【性状】 本品为浅棕色至棕色液体；气微，味甜、微苦。

【鉴别】 取本品 5 支内容物，蒸干，残渣加 0.3%氢氧化钠溶液 10ml 使溶解，滤过，滤液用稀盐酸调节 pH 值至 5～6，用乙酸乙酯 15ml 振摇提取，分取乙酸乙酯液，用铺有适量无水硫酸钠的滤纸滤过，滤液蒸干。残渣加乙酸乙酯 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取黄芪对照药材 1g，加水 20ml，煮沸 2 分钟，滤过，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 6μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇（30：1）作为展开剂，展开，取出，晾干，置氨蒸气中熏后置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 相对密度 应不低于 1.03（《中国药典》2025 年版四部通则 0601）。

pH 值 应为 4.5～6.5（《中国药典》2025 年版四部通则 0631）。

其他 应符合合剂项下有关的各项规定（《中国药典》2025 年版四部通则 0181）。

【功能与主治】 益气固表，养血调肝。用于气虚血亏、头昏头晕、面色不华、心悸气短、神疲乏力、食欲不振及气血虚弱者。

【用法与用量】 口服。成人一次 10～20ml，一日 2 次，服时摇匀。

【规格】 每支装 10ml

【贮藏】 密封，置阴凉干燥处。

【起草单位】 西安市中医医院

【复核单位】 陕西省食品药品检验研究院

陕西省医疗机构制剂标准