

陕西省药品监督管理局

陕西省医疗机构制剂标准

SXYLZJ-2026026

清嗓利咽颗粒

Qingsang Liyan Keli

【处方】	木蝴蝶	芦根
	黄芩	连翘
	桑叶	苦杏仁
	桔梗	沙参
	麦冬	玄参
	蝉蜕	薄荷
	枳壳	浙贝母
	甘草	金银花
	山豆根	

【制法】 以上十七味，加水煎煮二次，第一次 1.5 小时，第二次 1 小时，加水量依次为 8 倍量、6 倍量，煎液滤过，合并滤液，浓缩至相对密度为 1.31～1.33 (60℃) 的稠膏，加适量糊精和糖粉，混匀，制粒，干燥 (80℃)，制成 1000g，分装，即得。

【性状】 本品为棕黄色至棕褐色颗粒；味甜、微苦。

【鉴别】 (1) 取本品 10g，研细，加乙酸乙酯-甲醇 (3:1) 的混合溶液 30ml，超声提取 30 分钟，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取黄芩对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法 (《中国药典》2025 年版四部通则 0502) 试验，吸取上述两种溶液各 6μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以乙酸丁酯-甲酸-水 (7:4:3) 的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 2% 三氯化铁乙醇溶液。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的主斑点。

(2) 取本品 10g，研细，加甲醇 20ml，超声处理 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取枳壳对照药材 1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法 (《中国药典》2025 年版四部通则 0502) 试验，吸取上述两种溶液各 6μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水

(13:6:2) 下层溶液为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 喷以 3% 三氯化铝乙醇溶液, 在 105℃ 加热约 5 分钟置紫外光灯 (365nm) 下检视。供试品色谱中, 在与对照药材色谱相应的位置上, 显相同颜色的荧光主斑点。

(3) 取本品 10g, 研细, 加甲醇 30ml, 超声处理 20 分钟, 滤过, 滤液蒸干, 残渣加水 20ml 使溶解, 转移至分液漏斗中, 用乙醚振摇提取 2 次, 每次 10ml, 弃去乙醚液, 再用水饱和的正丁醇振摇提取 2 次, 每次 25ml, 合并正丁醇液, 蒸干, 残渣加甲醇 5ml 使溶解, 作为供试品溶液。另取金银花对照药材 0.5g, 加甲醇 8ml, 超声处理 20 分钟, 滤过, 滤液作为对照药材溶液。照薄层色谱法 (《中国药典》2025 年版四部通则 0502) 试验, 吸取上述两种溶液各 1 μ l, 分别点于同一聚酰胺薄膜上, 以醋酸为展开剂, 展开, 取出, 晾干, 置紫外光灯 (365nm) 下检视。供试品色谱中, 在与对照药材色谱相应的位置上, 显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定 (《中国药典》2025 年版四部通则 0104)。

【功能与主治】 清嗓利咽, 宣肺开音。用于急慢性咽炎, 上呼吸道感染。

【用法与用量】 温开水冲服, 成人一次 1 袋, 一日 3 次。

【规格】 每袋装 15g

【贮藏】 密封, 置阴凉干燥处。

【起草单位】 西安市中医医院

【复核单位】 陕西省食品药品检验研究院