

陕西省药品监督管理局

陕西省医疗机构制剂标准

SXYLZJ-2026002

避瘟解毒颗粒

Biwen Jiedu Keli

【处方】 广藿香
桔梗
茯苓
陈皮
苍术
连翘
甘草

紫苏叶
薄荷
炒白术
厚朴
滑石
芦根

【制法】 以上十三味，加水煎煮两次，第一次加水 10 倍量，第二次加水 8 倍量，每次各 1 小时，滤过，合并滤液，减压浓缩（-0.08~-0.09MPa，60~70℃）至相对密度为 1.30~1.35（60~80℃）的稠膏，加入适量糊精、蔗糖粉（糊精与蔗糖粉比例为 2：1），混匀，制成颗粒，干燥（60℃），制成 1000g，即得。

【性状】 本品为棕色至棕褐色的颗粒；气微，味甜、微苦。

【鉴别】 （1）取本品研细，取粉末 10g，加甲醇 20ml，超声处理 30 分钟，静置，取上清液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取连翘苷对照品，加甲醇制成每 1ml 含 0.25mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇（8：1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以 10%硫酸乙醇溶液，在 105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

（2）取橙皮苷对照品，加甲醇制成饱和溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述对照品溶液及【鉴别】（1）项下的供试品溶液各 2 μ l，分别点于同一以 1%氢氧化钠溶液制备的硅胶 G 薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-水（100：17：13）为展开剂，展开 3cm，取出，晾干，再以甲苯-乙酸乙酯-甲酸-水（20：10：1：1）的上层溶液为展开剂，展至不低于 8cm，取出，晾干，喷以 3%三氯化铝乙醇溶液，置紫外光灯（365nm）

下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

(3) 取苍术对照药材粉末 0.5g，加水 30ml，煎煮 15 分钟，水提取液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述对照药材溶液及【鉴别】（1）项下的供试品溶液各 5 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯（1：1）为展开剂，展开，取出，晾干，氨蒸气中熏后置紫外光灯（365nm）下立即检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

(4) 取白术对照药材粉末 0.5g，加水 30ml，煎煮 15 分钟，水提取液蒸干，残渣加甲醇 1ml 使溶解，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述对照药材溶液及【鉴别】（1）项下的供试品溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-丙酮（19：1）为展开剂，展开，展距 10cm 以上，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，至少显一个相同颜色的荧光主斑点。

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（《中国药典》2025 年版四部通则 0104）。

【功能与主治】 解表化湿，宣肺透热，祛风解毒，芳香避秽。用于感冒、上呼吸道感染、咳嗽、肺炎证属寒湿束表，热郁津伤，症见干咳，发热恶寒，头痛，咽痛微干，胃脘痞满，倦怠乏力，胸闷呕恶，纳呆便溏等。

【用法与用量】 温开水冲服。一次 1 袋，一日 2～3 次。

【规格】 每袋装 10g，每 1g 相当于饮片约 1.4g

【贮藏】 密封。

【起草单位】 西安中医脑病医院

【复核单位】 陕西省食品药品检验研究院