

陕西省药品监督管理局

陕西省医疗机构制剂标准

SXYLZJ-2026031

温经消痛片

Wenjing Xiaotong Pian

【处方】	桃仁	红花
	鸡血藤	川牛膝
	淫羊藿	丹参
	当归	吴茱萸
	香附	延胡索
	赤芍	柴胡

【制法】 以上十二味，当归、丹参、延胡索、香附粉碎成细粉，备用；其余桃仁等八味，加水煎煮二次，每次 1.5 小时，加水量依次为 8 倍量、6 倍量，合并煎液，滤过，滤液浓缩到相对密度为 1.31~1.33 (60℃) 的稠膏，加入上述细粉及适量糊精和糖粉，混匀，制粒，干燥 (<80℃)，压制成 1000 片，包薄膜衣，即得。

【性状】 本品为薄膜衣片，除去薄膜衣后显棕褐色；气清香，味苦。

【鉴别】 (1) 取本品粉末，置显微镜下观察，含糊化淀粉薄壁细胞团块淡黄色或近无色，糊化淀粉粒隐约可见（延胡索）。石细胞多单个散在或成对，呈类圆形、类梭形或不规则形，边缘不平整，细胞腔含棕色物（丹参）。分泌细胞类圆形，含棕色分泌物，周围细胞放射状排列（香附）。韧皮薄壁细胞壁稍厚，表面具斜向交错的微细纹理（当归）。

(2) 取本品 10 片，研细，加乙醚 20ml，超声处理 10 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取当归对照药材 0.5g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 6μl，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯（4：1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

(3) 取本品 10 片，研细，加乙醇 30ml，超声提取 30 分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加 0.3% 氢氧化钠溶液 15ml 使溶解，滤过，滤液用稀盐酸调节 pH 值至 5~6，用乙酸乙酯 15ml 振摇提取，分取乙酸乙酯液，用铺有适量无水硫酸钠的

滤纸滤过，滤液蒸干。残渣加乙酸乙酯 1ml 使溶解，作为供试品溶液。另取芒柄花素对照品，如甲醇制成每 1ml 含 1mg 的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（《中国药典》2025 年版四部通则 0502）试验，吸取上述两种溶液各 10 μ l，分别点于同一硅胶 G 薄层板上，以三氯甲烷-甲醇（10：1）作为展开剂，展开，取出，晾干，置氨蒸气中熏后置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】 应符合片剂项下有关的各项规定（《中国药典》2025 年版四部通则 0101）。

【功能与主治】 调经活血，温经止痛。用于月经后期，痛经，经行量少，经色紫暗有块等。

【用法与用量】 口服，一次 4 片，一日 3 次。

【规格】 每片重 0.3g

【贮藏】 密封，置阴凉干燥处。

【起草单位】 西安市中医医院

【复核单位】 陕西省食品药品检验研究院