

陕西省药品监督管理局

陕西省医疗机构制剂标准

SXYLZJ-2026048

氯化钾糖浆剂

Lühuajia Tangjiangji

Potassium chloride syrup

本品含氯化钾（KCl）应为9.5%~10.5%(g/ml)。

【处方】	氯化钾	100g
	橙皮酊	50ml
	单糖浆	100ml
	苯甲酸	0.6g
	纯化水	适量
	制成	1000ml

【制法】 取氯化钾加适量纯化水溶解，滤过，滤液加单糖浆混匀，待用。取苯甲酸溶于橙皮酊中，待溶解后细流加入上述含有单糖浆的氯化钾溶液中，边加边搅拌。加纯化水至1000ml，即得。

【性状】 本品为微黄棕色液体。

【鉴别】 （1）取本品，加热炽灼除去可能含有的铵盐，放冷后，加水溶解，再加 0.1%四苯硼钠溶液与醋酸，即生成白色沉淀。

（2）取本品，加稀硝酸使成酸性后，滴加硝酸银试液，即生成白色凝乳状沉淀；分离，沉淀加氨试液即溶解，再加稀硝酸酸化后，沉淀复生成。

【检查】 应符合糖浆剂项下有关的各项规定（《中国药典》2025年版四部通则0116）。

【含量测定】 精密量取本品 2ml，置 100ml 量瓶中，加纯化水稀释至刻度，摇匀，精密量取稀释液10ml，加铬酸钾指示液2滴，用硝酸银滴定液（0.1mol/L）滴定至淡红棕色，每 1ml 硝酸银滴定液（0.1mol/L）相当于 7.455mg的KCl。

【作用与用途】 本品为电解质补充药，能够治疗各种原因引起的低钾血症，预防低钾血以及洋地黄中毒引起频发性、多源性早搏或快速心律失常。

【用法与用量】 每日三次，每次10ml，饭后服用。

【注意】 1.口服可有胃肠道刺激症状，如恶心、呕吐、咽部不适、食道刺激，腹痛、腹泻等。一般饭后服用，在空腹胃肠道刺激性更易发生。

2.肾上腺性异常综合征伴盐皮质激素分泌不足者禁用。

3.服用期间需作以下随访检查：①血钾；②心电图；③血镁、钠、钙；④酸碱平衡指标；⑤肾功能和尿量。

4.有肾功能损害时服用本制剂应密切注意，防止发生高钾血症。

5.小儿、老年人、孕妇及哺乳期妇女慎用。

6.本品含糖量较高，糖尿病患者慎用。

【规格】 100ml:10g

【贮藏】 密闭、常温下保存。

【起草单位】 西安交通大学第二附属医院

【复核单位】 陕西省食品药品检验研究院