

陕西省药品监督管理局

陕西省医疗机构制剂标准

SXYLZJ-2026052

三溴合剂

Sanxiu Heji

Trichloride Compound

本品含总溴 (Br^-) 量应为 8.55%~9.45%。

【处方】	溴化钠	30g
	溴化钾	30g
	溴化铵	30g
	甜菊糖	1g
	5%羟苯乙酯乙醇溶液	10ml
	纯化水	适量
	制成	1000ml

【制法】 取溴化钠、溴化钾、溴化铵、甜菊糖溶于适量纯化水中，滤过，滤液中缓缓加 5%羟苯乙酯乙醇溶液，随加随搅拌，加纯化水至 1000ml，搅匀，即得。

【性状】 本品为无色澄明液体；味咸，无臭。

【鉴别】 显钠盐、钾盐、铵盐及溴化物的鉴别反应（《中国药典》2025 年版四部通则 0301）。

【检查】 应符合合剂项下有关的各项规定（《中国药典》2025 年版四部通则 0181）。

【含量测定】 精密量取本品 2ml，置 25ml 容量瓶中，用蒸馏水稀释至刻度，摇匀，精密量取稀释液 5ml，加铬酸钾指示液 2 滴，用硝酸银滴定液（0.1mol/L）滴定至淡红棕色。每 1ml 硝酸银滴定液（0.1mol/L）相当于 1.059mg 的 Br^- 。

【作用与用途】 镇静药。加强大脑皮层抑制过程，主要用于神经衰弱。

【用法与用量】 饭后口服。一次 10ml，一日 3 次。

【注意】 1.本品有刺激性，口服可引起胃不适，偶可发生呕吐，须用温开水稀释后服用。

2.久服易引起溴蓄积中毒。中毒时应立即停药，增加食物中食盐的用量或服

用双氢克尿噻以促进溴化物排泄。

【规格】 100ml/瓶

【贮藏】 密闭，阴凉处保存。

【起草单位】 三二〇一医院

【复核单位】 陕西省食品药品检验研究院

陕西省医疗机构制剂标准